

VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC / ŠOLO PO PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI ALI OKUŽBI - SMERNICE

KAPLJIČNE NALEZLJIVE BOLEZNI

| | VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC / ŠOLO |
|-----------------|--|
| GRIPA | Po 7 dneh od začetka bolezni oziroma po ozdravitvi. |
| OSLOVSKI KAŠELJ | Po 5 dneh od začetka antibiotičnega zdravljenja, oziroma po 21 dneh od začetka bolezni, če ni bilo antibiotičnega zdravljenja. |
| DAVICA | Odloči otrokov zdravnik, po posvetu z območnim epidemiologom. |
| TUBERKOLOZA | Odloči pulmolog iz pulmološkega dispanzerja. |

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

| | VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC / ŠOLO |
|--|--|
| DRISKA/BRUHANJE* (Campylobacter, E. coli, Giardia, Salmonella, rotavirus, norovirus) | Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske. |
| HEPATITIS A | Po 14 dneh po pojavu prvih znakov oziroma po 7 dneh po pojavu zlatenice. |
| E. COLI (VTEC) | Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske. |
| TIFUS, PARATIFUS | Po prvem negativnem izvidu vzorca blata (potrdilo izda območni ZZV). |
| GRIŽA (Šigeloz) | Po prvem negativnem izvidu vzorca blata (potrdilo izda območni ZZV). |
| KRIPTOSPORIDIOZA | Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske. |
| GLISTAVOST | Ni omejitev. |

NALEZLJIVE BOLEZNI Z IZPUŠČAJI

| | VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC / ŠOLO |
|---------------------------------------|---|
| OŠPICE | Po 4 dneh po pojavu značilnega izpuščaja. |
| RDEČKE | Po 6 dneh po pojavu značilnega izpuščaja. |
| MUMPS | Po 5 dneh po pojavu značilne otekline. |
| ŠKRLATINKA, STREPTOKOKNA ANGINA | Po 24 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja. |
| NORICE | Po 5 dneh po pojavu značilnega izpuščaja, oziroma ko ni več svežih mehurčkov in se vsi mehurčki posušijo. |
| INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA | Ni omejitev. |
| PETA BOLEZEN** (Erythema infectiosum) | Ni omejitev. |
| ŠESTA BOLEZEN (Erythema subitum) | Ni omejitev. |
| HERPES | Ni omejitev. |

KOŽNE NALEZLJIVE BOLEZNI

| | VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC / ŠOLO |
|------------------|--|
| NAGLAVNA UŠIVOST | Takoj po uspešno opravljenem razuševanju. |
| GARJE | Takoj po uspešno izvedenem postopku zdravljenja. |
| MEHKUŽKE | Ni omejitev, če so kožne spremembe pokrite. |
| BRADAVICE | Ni omejitev. |
| MIKROSPORIJA*** | Ni omejitev***, če so kužne spremembe pokrite. |

NALEZLJIVE BOLEZNI, KI SE PRENAŠAJO S KRVJO IN OSTRIMI PREDMETI

| | VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC / ŠOLO |
|---------------|----------------------------------|
| HEPATITIS B,C | Ni omejitev. |
| HIV / AIDS | Ni omejitev. |

DRUGE NALEZLJIVE BOLEZNI IN OKUŽBE

| | VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC / ŠOLO |
|---------------------------|--|
| BOLEZEN ROK, NOG, UST**** | Ko ni več svežih mehurčkov in se vsi mehurčki posušijo. |
| GNOJNO VNETJE KOŽE | Po 48 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja, če so gnojne rane pokrite. |

* otroci lahko izločajo povzročitelja v blatu tudi še več tednov po preboleli bolezni, zato je potreben poostren higienski režim pri previjanju v vrtcu oziroma po uporabi stranišča.

** peta bolezen, ki jo povzroča Parvovirus B19 lahko ogroža plod v zgodnji nosečnosti (do 20.tedna). Nosečnico je treba obvestiti, če so v skupini otroci, ki preborevajo peto bolezen in ji svetovati posvet z ginekologom.

*** otrokom, ki imajo kožne spremembe na odkritih delih telesa se odsvetuje udeležba pri šolski telovadbi in skupinskih športih do prvega negativnega mikološkega izvida.

**** povzročajo različni Coxsacki virusi.